

Stroomdiagram 3

Richtlijn Rhinopneumonie bij het paard – Neurologische vorm

Overwegingen

Insturen van swabs en EDTA-bloed van contactpaarden met koorts maar (nog) geen neurologische verschijnselen vergroot kans om diagnose te stellen.

Incubatietijd: 1-10 dg na koortspiek neurologische verschijnselen.

Percentage neurologische patiënten op een bedrijf tussen 5-50%.

Virusremmers en immunostimulantia weinig/geen bewezen effect.

Gebruik van kortwerkende dexamethason vaak 'last resort', kan namelijk ook reactivatie bevorderen; dus alleen voor ernstige neurologische verschijnselen.

Geen vaccins met claims voor de neurologische vorm, wel reductie virusexcretie.

Vaccineren op besmet bedrijf niet aan te raden.

Eventueel wel herhalingsvaccinatie van paarden op eerder gevaccineerde contactbedrijven, primaire vaccinatie geeft waarschijnlijk te late immuniteit.

EHV-1 hoeft niet te zijn 'ingeslept', kan een reactivatie zijn bij 'eigen' paard.

Adviseer bedrijf 28 dagen gesloten te houden na begin laatste neurologie- of koortsgeslacht en dit is eventueel in te korten tot 14 dagen na negatief PCR-resultaat van neusswabs van alle aanwezige paarden bij een zogenaamde 'eindscreening'.

Stroomdiagram 3: Verdenking Rhinopneumonie – Neurologische vorm

