

Stroomdiagram 1: Eerste levensweek (1 van 2)

Richtlijn Veterinair handelen bij vleeskuikens rondom de opzet en eerste levensweek op het vleeskuikenbedrijf

Begrippen

Navelscore

Score van de navel op afwijkingen waarbij drie categorieën worden gehanteerd om de navelkwaliteit op een praktische manier te beschrijven:

- gesloten en schone navel (score 0),
- zwarte 'button' kleiner dan of gelijk aan twee millimeter of zwarte draad (score 1),
- zwarte button groter dan twee millimeter of open navel (score 2).

Therapie falen bij eerste weeks uitval

De uitval blijft meer dan een 0,5% per dag en/of het aantal aangetaste dieren blijft meer dan 2% per dag.

Therapie succes bij eersteweeks uitval

De uitval daalt naar minder dan 0,5% per dag en/of het aantal aangetaste dieren daalt naar minder dan 2% per dag.


Waarschijnlijkheidsdiagnose

Diagnose gebaseerd op de anamnese, data inspectie, bedrijfs- en koppelinspectie en het lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek bestaat in ieder geval uit: de beoordeling van de cloacatemperatuur, kropvulling en navelkwaliteit van minimaal 30 kuikens en postmortaal onderzoek van minimaal 5 typische representanten en 5 recent gestorven dieren.

Zie voor nadere uitleg begrippen en stroomdiagram de richtlijn:

Veterinair handelen bij vleeskuikens rondom de opzet en eerste levensweek op het vleeskuikenbedrijf

Stroomdiagram 1: De inzet van antimicrobiële middelen in de eerste levensweek



* Nadere uitleg over deze begrippen kunt u vinden op de andere zijde