

Stroomdiagram 2

Richtlijn Rhinopneumonie bij het paard – Abortus

Overwegingen

Er is een 'abortus pakket' dat alles bevat wat nodig is om een vaginale swab van de merrie en een longbiopt van het veulen te nemen.

Dode veulen/vrucht + placenta goed ingepakt insturen voor sectie heeft wat meer kosten, maar geeft als het geen EHV-1 zou zijn, meestal wel een andere diagnose.

Incubatietijd van de abortusvorm is 7 dagen tot enkele maanden na de infectie.

Er is slechts één vaccin geregistreerd dat claimt enige bescherming te geven tegen de abortusvorm; merries vaccineren in 5e, 7e en 9e maand van de dracht.

Vaccineren op besmet bedrijf niet aan te raden.

Eventueel wel herhalingsvaccinatie van paarden op eerder gevaccineerde contactbedrijven, primaire vaccinatie geeft waarschijnlijk te late immuniteit.

EHV-1 hoeft niet te zijn 'ingesleept', kan een reactivatie zijn bij 'eigen' paard.

Adviseer bedrijf 28 dagen gesloten te houden na laatste abortus.

Inseminatie in de veulenhengstigheid is mogelijk minder succesvol in verband met verstoord verlopen puerperium.

Stroomdiagram 2: Verdenking Rhinopneumonie – Abortus

